Телефоны доверия:

8-800-300-83-83

8-800-300-11-00

8-800-2000-122

Центр психологического здоровья детей:

229-98-98

Детский Центр кризисных состояний:

320-36-93

Центр "Диалог"

Тел. 251-29-04

Адрес Центра "Диалог"

Город Екатеринбург, ул. 8 марта, 55А

«Мир, вероятно, спасти уже не удастся, Но отдельного человека всегда можно». И. Бродский

Буклет для педагогов

"Профилактика суицидального поведения подростка"



Педагог-психолог Приданникова М.А. Прежде чем совершить суицидальное действие в большинстве случаев наблюдается подготовительный период.

Вы можете заметить признаки готовящегося самоубийства у детей:

1. По словам:

- Часто говорит о своем душевном состоянии;
- Прямые высказывания «Нет смысла жить дальше»;
- Косвенные высказывания –«Ничего, скоро вы от меня отдохнете»;

2. По поведению:

- подавленное настроение;
- проявление раздражительности, угрюмости;
- потеря аппетита или чрезмерное обжорство;
- бессонница;
- интерес к возможным способам самоубийства;
- приведение своих дел в порядок;
- прощание с друзьями и выражение благодарности.

ПРИЧИНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУИЦИДА

- •отсутствие доброжелательного внимания со стороны взрослых;
- резкое повышение общего ритма жизни;
- •жестокое обращение с подростком, психологическое, физическое насилие;
- •алкоголизм и наркомания среди подростков;
- неуверенность в завтрашнем дне;
- •отсутствие морально-этических ценностей;
- потеря смысла жизни;
- •низкая самооценка, трудности в самоопределении;
- •бедность эмоциональной и интеллектуальной жизни;
- безответная влюбленность.

Если замечена склонность к самоубийству....

Рекомендации

- ни в коем случае не оставлять нерешенными проблемы, касающиеся сохранения физического и психического здоровья ребенка;
- анализировать вместе каждую трудную ситуацию;

- воспитывать в ребенке привычку рассказывать родителям не только о своих достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах;
- не опаздывать с ответами на его вопросы по различным проблемам;
- не иронизировать над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался слабым физически и морально, помочь ему и поддержать его, указать возможные пути решения возникшей проблемы;
- обсудить с ним работу служб, которые могут оказать помощь в ситуации, сопряженной с риском для жизни; записать соответствующие номера телефонов;

Первая помощь при суициде

Если Вы стали свидетелем самоубийства, а у Вас нет времени на преодоление собственного эмоционального шока, нужно принять быстрые действия:

- Необходимо вызвать помощь по телефону.
- Попытаться оказать первую доврачебную помощь: остановить кровотечение - на вены наложить давящую повязку, на артерии (пульсирующая алая струя)- жгут выше раны;
- если нет пульса, проводить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия бригады скорой помощи;
- при отравлении вызвать рвоту, если человек в сознании!
- при бессознательном состоянии следить за проходимостью дыхательных путей и повернуть голову на бок, чтобы не запал язык и не оставлять его одного!!!

Самоубийство ребёнка часто бывает полной неожиданностью для всех. Помните, дети решаются на это внезапно!